



Серия АА

0001022

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

# РАЗРЕШЕНИЕ

НА ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ФС № 2006/060

от « 26 » апреля 2006 г.

**«Применение препарата Диспорт®  
(ботулинический токсин типа А) для устранения избыточной  
активности мимических морщин»**

**Разрешение выдано на имя:** ОАО «Институт пластической хирургии и косметологии»

105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 27

ООО «Клиника Сесиль+»

125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 5, стр. 1

**Показания к использованию медицинской технологии:**

- Мимические морщины в области межбровья.
- Мимические горизонтальные морщины лба.
- Морщины в области наружных углов глаз («гусиные лапки»).
- Морщины спинки носа.
- Глубокие складки лица в сочетании с внутрикожным введением препаратов контурной пластики.
- Может быть использован в качестве профилактики старческой атрофии кожи лица и шеи (L 57.4 по международной классификации болезней 10 пересмотра).

**Противопоказания к использованию медицинской технологии:**

Абсолютный противопоказания:

- Нервно-мышечные нарушения (миастения, синдром Ламберта Итона и др.).
- Воспалительный процесс в месте введения, острая фаза инфекционных заболеваний.
- Беременность, период грудного вскармливания.
- Гемофилия.
- Высокая степень миопии.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

## Продолжение

ФС № 2006/060

от « 26 » апреля 2006 г.

Относительные противопоказания:

- Отягощенный аллергологический анамнез (особенно препараты, содержащие белки).
- Прием: антибиотиков группы аминогликозидов (гентамицина, канамицина, стрептомицина), эритромицина, тетрациклина, линкомицина, полимиксинов, усиливающих действие токсина (если не прошло более двух недель после проведения курса лечения); препаратов, повышающих внутриклеточную концентрацию кальция (аминопиридин и др.); бензодиазепинов; миорелаксантов; аспирина и других препаратов – антикоагулянтов и антиагрегантов.
- Соматические заболевания в стадии обострения, злоупотребление алкоголем.
- Выраженный гравитационный птоз тканей лица.
- Выраженные «грыжи» в области верхних и нижних век.
- Склонность к отекам лица.
- Период менее 3 месяцев после перенесенной хирургической операции на лице.

**Возможные осложнения при использовании медицинской технологии и способы их устранения:**Осложнения:

Микрогематомы в месте инъекции (5-10%), головная боль (в течение 1-2 дней после процедуры, 2-5%), птоз верхнего века (< 1%), отечность периорбитальной области.

Рекомендации по их устранению:

После процедуры пациентам рекомендуется: находиться в вертикальном положении в течение 3-4 ч.; не трогать руками область введения препарата и охладить место инъекции (приложить лед) на 20-30 мин; активно напрягать мышцы в области введения препарата в течение дня по 3-5 мин с интервалом 2-3 ч.; не проводить массаж лица, ионофорез и другие физиопроцедуры, не посещать баню или сауну, избегать воздействия высоких температур на область лица в течение 2 недель.

Врио руководителя

Е.А.Тельнова

Дата выдачи: 20.05.2011

\* (подпись, печать)