

Процедура объемного моделирования периорбитальной зоны.

Т.Б. Косцова, кандидат медицинских наук, косметолог, сертифицированный тренер по инъекционным методикам Лабораторий Филорга

Для проведения процедур объемного моделирования Лаборатории **Филорга** (Франция) разработали линейку филлеров на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты (ГК). Коллекция интрадермальных наполнителей Filorga включает универсальный филлер X-NA3 для решения проблем пациентов с инволюционными изменениями мягких тканей лица, который адаптирован для введения на любую глубину. А сочетание пластичности и вязкости позволяет корректировать практически все зоны лица, восполняя утраченный объем и выравнивая рельеф кожи.

При необходимости применения большого количества гиалуроновой кислоты рекомендуется препарат X-NAVolume. Его вводят глубоко в ткани, супрапериостально. Он показан при объемном моделировании скул, подбородка и др.

Для микрокоррекции таких деликатных зон, как периорбитальная и периоральная, разработан препарат M-NA18. Он содержит свободную ГК и многоатомный спирт глицерол, выступающий в качестве антиоксиданта и стабилизатора для гиалуроновой кислоты. Кроме того, ГК в составе препарата имеет высокий молекулярный вес — 3 млн Да. Такие показатели позволяют использовать M-NA18 для работы с периорбитальной зоной без риска формирования стойких отеков.

Коррекция зоны вокруг глаз заключается в устранении «темных кругов», а также в элевации бровей

Подготовка к процедуре

Перед началом процедуры традиционно проводят сбор анамнеза, определяют показания к проведению воздействия, выясняют ожидания пациента. Для проведения любой инъекционной процедуры необходимо подписание информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.

1. Асептика

Область коррекции обрабатывают антисептическим раствором хлоргексидина 0,05%. В случае необходимости проводят разметку зоны коррекции, в процессе которой отмечают линию проекции нижнего края орбиты для определения зоны введения препарата.

2. Коррекция подглазничной области

Препарат M-NA18 относится к группе пролонгированных биоревитализантов. Состав: свободная гиалуроновая кислота высокой молекулярной массы — 3 млн Да, многоатомный спирт глицерол 20 мг/мл. Задачи: коррекция «темных кругов» под глазами, ревитализация кожи, микрокоррекция морщин.

Препарат вводят глубоко супрапериостально, под углом 45 градусов. Линия коррекции проходит несколько ниже края орбиты (на 5–6 мм). Препарат вводят в небольшом количестве (не более 0,15 мл за один вкол), расстояние между вколами — 5–10 мм. Методика введения — линейно-ретроградная, пирамидальная. Ее выбор продиктован тем, что возникновение «темных кругов» не всегда связано с качеством кожи, но также с физиологическими процессами, приводящими к перераспределению подкожной жировой клетчатки и созданию ее дефицита в этой области. В этой связи требуется не только ревитализация кожи, но и устранение депрессии тканей в подглазничной области. Однако введение филлера на основе стабилизированной ГК повышает риск появления стойких отеков (они могут сохраняться многие месяцы), что и делает

закономерным выбор препарата М-НА18, совместившего свойства интрадермального наполнителя и пролонгированного биоревитализанта.

3. Моделирующий массаж

По окончании филлинга проводят моделирующий массаж. Задачи: равномерное распределение препарата в тканях.

4. Коррекция бровей

Задачи: элевация бровей с целью сделать взгляд зрительно более открытым.

Препарат вводят в проекцию нижней границы брови, линейно-ретроградной методикой. Коррекции подвергают латеральную часть брови. По окончании филлинга проводят моделирующий массаж.

Задачи: равномерное распределение препарата в тканях.

5. Завершающий этап

По окончании процедуры наносят крем «Траумель С». Задачи: профилактика образования гематом. Продолжительность процедуры — 30–45 минут. Курс — 2 процедуры, 1 раз в месяц. Терапевтический эффект длится 6–9 месяцев.

Домашний уход

Средства для домашнего ухода профессиональной косметической линии **ФилоргаProfessional**.

