


АЛГОРИТМ РАБОТЫ КЛИНИКИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2



1.1 При первичном обращении пациента администратор опрашивает согласно протоколу:

1.) Наличие симптомов острого респираторного заболевания на момент обращения и в течение 3 недель до предполагаемой консультации

- повышения температуры да / нет
- озноба да / нет
- кашля да / нет
- чихания да / нет
- насморка да / нет
- першения или боли в горле да / нет
- боли в мышцах да / нет
- затрудненного дыхания да / нет
(невозможности осуществить полный вдох)
- учащенного дыхания да / нет

2.) Тесный контакт с лицами, которые госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию да / нет

3.) Тесный контакт с лицами, у которых лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. да / нет

4.) Исследование мазка из носо- и/или ротоглотки на РНК коронавируса SARS-CoV-2 - положительный/отрицательный результат

При подтверждении одного из пунктов: рекомендовать отказаться от посещения института, вызвать врача на дом по месту жительства для назначения лечения, отложить консультацию на 3 недели и/или до получения 2 отрицательных исследований на РНК SARS-CoV-2 при отсутствии симптомов острого респираторного заболевания не менее 14 дней

2.1 Изолированный вход для пациентов с разделением потоков

При входе всем посетителям проводится двукратная дистанционная термометрия с временным промежутком 5 минут.

Разделение потока первичных амбулаторных пациентов и госпитализирующихся в стационарное отделение.

Использование масок (или щитков) и перчаток администраторами и медперсоналом, сопровождающими первичных пациентов

Соблюдение безопасной дистанции более 2 м

2.2 Организация помещения для ожидания пациентов с учётом соблюдения безопасной дистанции

Планирование более длительных интервалов между приёмом пациентов для исключения их тесных контактов в зале ожидания

Ограничение количества одновременно находящихся в помещении пациентов с учётом площади

Ограничение доступа сопровождающих лиц. Возможен проход одного сопровождающего при условии маломобильности пациента и при необходимости оказания медицинской помощи ребенку при соблюдении требования обязательной термометрии и карантинного режима.

Дистанционное оповещение пациентов через информационное табло

Стойки бесконтактной оплаты

Расстановка санитайзеров и комплектов с средствами индивидуальной защиты при входе в клинику/зал ожидания

2.3 Организация помещения для приёма пациентов

Наличие комплектов СИЗ одноразового использования для медицинского персонала

Исключение из помещения предметов, не поддающихся быстрой санитарной обработке, в том числе бумажных носителей информации

Создание возможности для дистанционного ведения амбулаторной карты, в том числе средствами голосового набора

Регулярное проветривание помещения

2.4 Соблюдение гигиенических рекомендаций для пациентов

Использование хирургической маски пациентом при непосредственном общении с врачом

Мытье рук и/или обработка санитайзером при входе в помещение и выходе

2.5 Использование СИЗ персоналом при условии прохождения предварительного обучения

Всему персоналу следует соблюдать стандартные меры предосторожности для профилактики распространения инфекции.

Рекомендуется поддержание разумной дистанции с пациентом в течение всех процедур

Необходимо в обязательном порядке мыть руки с дезинфицирующим раствором до и после всех взаимодействий с пациентом, контактом с потенциальными источниками инфекций, а также перед надеванием и снятием СИЗ, включая перчатки.

Минимальный состав комплекта СИЗ для персонала на основе стратификации риска (низкий риск инфицирования SARS-CoV-2):

А.) Медицинская маска

Б.) Медицинская шапочка

В.) Защитные очки

Г.) Одноразовый халат

Д.) Перчатки

2.6 Санитарная обработка

- Очистка поверхностей дезинфицирующими растворами в соответствии с инструкцией после каждого пациента. Генеральная уборка дважды в сутки.

- Все инструменты многократного использования должны обрабатываться в соответствии с установленным стандартом.

- **Организация хирургического лечения**

- 3.1 Соблюдение критериев отбора пациентов с учетом абсолютных и относительных противопоказаниями
 - Исключение пациентов высокого риска операционных осложнений на этапе предварительной консультации: декомпенсация хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной патологии, эндокринных нарушений, аутоиммунных заболеваний и иммунодефицитных состояний.
 - Соблюдение стандартного плана предоперационной оценки состояния пациента + исследование на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 (исследование мазка из носоглотки и ротоглотки за 1-3 дня до проведения оперативного вмешательства или при возможности проведения исследование на специфические Ig G к новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в течение 2 недель до исследования)
 - Проведение КТ лёгких максимально приближенно к дате оперативного вмешательства (оптимально за день или в день операции)
- 3.2 Соблюдение санитарного-эпидемиологического режима в условиях стационара
 - Максимально изолированные палаты 1 и 2-местные палаты для пациентов
 - Соблюдение безопасной дистанции между пациентами более 2 м
 - Регулярное тестирование медицинского персонала стационара (1 раз в неделю исследование мазка из носоглотки и ротоглотки на РНК SARS-CoV-2)
 - Использование СИЗ при проведении хирургических вмешательств и эндоскопических процедур, осуществлении перевязок. Минимальный состав СИЗ:
 - А.) Респиратор FFP3 или FFP2
 - Б.) Медицинская шапочка
 - В.) Защитные очки и/или лицевой щиток
 - Г.) Влагонепроницаемый халат с длинным рукавом
 - Д.) Минимум 2 пары перчаток


КАК БЕЗОПАСНО СНЯТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

СПОСОБ 1

Существует множество способов безопасного снятия СИЗ без угрозы загрязнения вашей одежды, кожи или слизистых оболочек потенциально опасными инфекционными материалами. Например: перед выходом из палаты пациента снимите все СИЗ кроме респиратора, если он надет. Снимите респиратор после выхода из палаты и закрытия двери. Последовательность снятия СИЗ:

1. ПЕРЧАТКИ

- Снаружи перчатки загрязнены!
- Если вы испачкали руки во время снятия перчаток, немедленно вымойте их или используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе
- Рукой в перчатке возьмите другую руку в области ладони снимите первую перчатку
- Не прикасайтесь к ней без перчатки
- Проведите пальцами руки под манжетой надетой перчатки на запястье и снимите вторую перчатку при помощи первой
- Выбросьте перчатки в контейнер для отходов




2. ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И ЛИЦЕВОЙ ЩИТОК

- Наружная поверхность очков и щитка загрязнены!
- Если вы испачкали руки во время снятия очков или лицевого щитка, немедленно вымойте их или используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе
- Снимите защитные очки и щиток со спины, потянув вверх крепление или дужки
- Если предмет многоразового использования, поместите его в специальную емкость для переработки. В противном случае выбросьте в контейнер для отходов




3. ХАЛАТ

- Рукава и халат спереди загрязнены!
- Если вы испачкали руки во время снятия халата, немедленно вымойте их или используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе
- Развяжите завязки, следя за тем, чтобы рукава не касались вашего тела и одежды
- Снимите халат с шеи и плеч, касаясь только его внутренней стороны
- Выверните халат наизнанку
- Сложите или сверните халат и выбросьте в контейнер для отходов




4. МЕДИЦИНСКАЯ МАСКА ИЛИ РЕСПИРАТОР

- Внешняя сторона загрязнена - НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НЕЙ!
- Если вы испачкали руки во время снятия маски/респиратора, немедленно вымойте их или используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе
- Возьмитесь за нижние завязки или фиксаторы, затем за верхние и снимите маску/респиратор, не касаясь передней части
- Выбросьте в контейнер для отходов



5. НЕМЕДЛЕННО ВЫМОЙТЕ РУКИ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО НА СПИРТОВОЙ ОСНОВЕ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ВСЕХ СИЗ




ВЫМОЙТЕ РУКИ СРАЗУ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ВСЕХ СИЗ И НЕМЕДЛЕННО В ПРОЦЕССЕ СНЯТИЯ, ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ ЗАГРЯЗНЕНЫ

КАК БЕЗОПАСНО СНЯТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СПОСОБ 2

Существует другой способ безопасного снятия СИЗ без угрозы загрязнения вашей одежды, кожи или слизистых оболочек потенциально опасными инфекционными материалами. Например: перед выходом из палаты пациента снимите все СИЗ кроме респиратора, если он надет. Снимите респиратор после выхода из палаты и закрытия двери. Последовательность снятия СИЗ:

1. ХАЛАТ И ПЕРЧАТКИ

- Халат спереди и рукава, а также перчатки снаружи контаминированы!
- Если вы испачкали руки во время снятия халата или перчаток, немедленно вымойте их или используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе
- Возьмитесь за халат спереди и потяните вперед от тела так, чтобы завязки разорвались, касайтесь внешней стороны халата только руками в перчатках
- При снятии халата сложите или сверните его
- Во время снятия халата одновременно снимайте перчатки, касаясь только внутренней части перчаток и халата голыми руками
- Поместите халат и перчатки в контейнер для отходов



2. ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И ЛИЦЕВОЙ ЩИТОК

- Наружная поверхность очков и щитка контаминированы!
- Если вы испачкали руки во время снятия очков или лицевого щитка, немедленно вымойте их или используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе
- Снимите защитные очки и щиток со спины, потянув вверх крепление или дужки
- Если предмет многоразового использования, поместите его в специальную емкость для переработки. В противном случае выбросьте в контейнер для отходов




3. МЕДИЦИНСКАЯ МАСКА ИЛИ РЕСПИРАТОР

- Внешняя сторона контаминирована - НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НЕЙ!
- Если вы испачкали руки во время снятия маски/респиратора, немедленно вымойте их или используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе
- Возьмитесь за нижние завязки или фиксаторы, затем за верхние и снимите маску/респиратор, не касаясь передней части
- Выбросьте в контейнер для отходов



4. ВЫМОЙТЕ РУКИ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО НА СПИРТОВОЙ ОСНОВЕ СРАЗУ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ВСЕХ СИЗ



**ВЫМОЙТЕ РУКИ СРАЗУ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ВСЕХ СИЗ И НЕМЕДЛЕННО
В ПРОЦЕССЕ СНЯТИЯ, ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ ЗАГРЯЗНЕНЫ**